


G-aenial Universal Injectable, CAS: 41637-38-1 4,4'-isopropyylideenidifenolin, etoksyloidun ja 2-metyylipropin-2-eenihapon esteröintituotteet 10-<25%.CAS: 43048-08-4 EINECS: 256-062-6 (oktahydro-4,7-metano-1H-indenediyyli)bis(metyleeni) bismetakrylaatti 5-<10%. CAS: 1985-51-9 EINECS: 217-856-8 2,2--dimetyyli-1,3-propaanidiyyli bismetakrylaatti 2,5-<5%. CAS: 9003-08-1 1,3,5-Triatsiini-2,4,6-triamiini, polymeeri formaldehydin kanssa 1-<2,5%. CAS: 72869-86-4 EINECS: 276-957-5 7,7,9(tai 7,9,9) trimetyyli-4,13-diokso-3,14-dioksa-5,12-diatsaheksadekaani-1,16-diyylibismetakrylaatti. 0,5-<1%. CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 titaanidioksidi 0,2-<0,5%. CAS: 109-16-0 EINECS: 203-652-6 2,2'-etyleenidioksidietyyli dimetakrylaatti 0,2-<0,5%. CAS: 128-37-0 EINECS: 204-881-4 2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli ≥0,25-<0,5%. CAS: 2440-22-4 EINECS: 219-470-5 2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-p-kresoli ≥0,25-<0,5%. CAS: 75980-60-8 EINECS: 278-355-8 difenyyli(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)fosfiinioksidi 0,2-<0,5%. CAS: 1879-09-0 EINECS: 217-533-1 6-tert-butyyli-2,4-ksylenoli 0,1-<0,2%	Yleisohjeet: Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi. Annettava tekohengitystä hengityksen ollessa epätasainen tai pysähtynyt. Käännyttävä lääkärin puoleen oireiden jatkuessa. · Hengitettynä: Huolehdittava raittiin ilman saannista, tarvittaessa annettava tekohengitystä, pidettävä lämpimänä. Oireiden jatkuessa pyydettävä lääkärin apua. Vietävä raittiiseen ilmaan ja asetettava makuulle. · Ihokosketuksessa: Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin. Saatettava lääkärin hoitoon. Käännyttävä lääkärin puoleen, mikäli iho on jatkuvasti ärsyyntynyt. · Aineen päästyä silmiin: Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestäessä käännytään lääkärin puoleen. · Nieltyä: Huuhdotaan suu ja juotetaan runsaasti vettä. Käännyttävä lääkärin puoleen oireiden jatkuessa.	8.7.2024		Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Kapselista, Muovin vieminen hampaalle, valokovetus. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 2x30sek/ paikkaus.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0
IconEtch Kloorivety (HCl).	Ensiaputoimenpiteet 15 - 20 % Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitettynä Huolehdittava raittiista ilmasta. Kysyttävä lääkärin neuvoa. Jos tajuttomuuden vaara, henkilö on asetettava kylkiasentoon. Iholle saatuna Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vesi. Saastunut vaatetus riisuttava välittömästi ja hävitettävä turvallisesti. Silmäkosketus Henkilöt on vietävä pois vaara-alueelta. Avoimia silmiä on huuhdeltava juoksevalla vedellä 10 - 15 min. Kysyttävä lääkärin neuvoa. Nieltynä Älä oksennuta. Suu huuhdeltava välittömästi ja sen jälkeen juotava runsaasti vettä. Kysyttävä lääkärin neuvoa.	20.4.2016		Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Kapselista, Etsin vieminen hampaalle, valokovetus. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 2x30sek/ paikkaus.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0
MTA Universal - DirectCaps Mineraalioksidiseos **Muut tiedot** **Tuote sisältää lisäksi mm. vismuttioksidia**		5.10.2018		Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Kapselista, Eristeen vieminen hampaalle. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 20sek/ paikkaus.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0
Retraction paste Aluminium chloride hexahydrate 10-25%		17.3.2021		Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Kapselista, retraktionpastan vieminen ienraunan alle. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 40sek/ paikkaus.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0